

## RADIOFREKVENČNÁ OPERÁCIA VARIXOV

Radiofrekvenčná ablácia je metóda operácie krčových žíl, pri ktorej sú teplom likvidované postihnuté kmeňové povrchové žily. Jedná sa o hlavné povrchové žily – veľkú safénu / t.j. žilu , ktorá odvádza krv z povrchových žíl prednej strany nohy, predkolenia a zo stehna/ a malú safenu, ktorá odvádza krv z povrchových žíl lýtka.. Zárok sa vykonáva v lokálnom znecitlivení, kedy pod sonografickou kontrolou najprv zavádzame radiofrekvenčný katéter do operovanej žily a potom postupne injekciami aplikujeme lokálnu anestézu okolo operovanej žily. Následuje tepelná deštrukcia žily katétrom.

Radiofrekvenčným katetrom sa dajú likvidovať len žily, ktoré nie sú kľukaté a preto je vo väčšine prípadov súčasťou operácie aj sklerotizácia varikózných prítokov, t.j. injekčná aplikácia sklerotizačného roztoku alebo peny do týchto žíl, čo má za následok likvidáciu týchto prítokov /viď poučenie/.

Hneď po operácii sa na operovanú nohu navlieka kompresívna pančucha. Následne treba pančuchu nosiť 7 dní / 24 hodín denne/, dáva sa dolu len pri sprchovaní. Potom ešte minimálne 3 týždne treba nosiť pančuchu cez deň. 5 dní po operácii doporučujeme kľudový režim /bez fyzickej záťaže/, potom môže pacient ísť do práce. Deň pred operáciou, tesne po operácii a potom ešte 8 dní pacient dostáva injekcie na riedenie krvi ako prevenciu žilovej trombózy. Po operácii môžu byť krvné podliatiny, po sklerotizácii varikózných prítokov zostávajú podkožné zatvrdiny.

Operácia nevyžaduje u zdravých pacientov žiadnu prípravu, nie je potrebné interné predoperačné vyšetrenie, stačí vyšetrenie krvi na zrážanlivosť. U pacientov s pridruženými ochoreniami postupujeme individuálne.

Operáciu vykonávame na žiadosť pacienta a pacient si ju hradí sám / nie je účtovaná zdravotnej poisťovni/. Cena operácia varixov jednej dolnej končatiny je 550 Eur

Možné komplikácie počas operácie :

- nedostatočné lokálne znecitlivenie
- alergia na lokálne anestetikum - nutné prerušenie podávania
- popálenie kože pri použití neprimeranej energie resp.pri zlyhaní uzemnenia

Možné pooperačné komplikácie :

- zápal operovaných žíl – postihuje prítokové žily – nehrozí pri ňom embolizácia, vyžaduje väčšinou len lokálnu liečbu, niekedy treba dlhšie podávať injekcie na riedenie krvi
- pretrvávanie priechodnosti operovanej žily – pri nedostatočnom tepelnom poškodení operovanej žily môžu zostať neuzatvorené úseky tejto žily – vo veľkej väčšine prípadov nevyžadujú ďalšiu operáciu, riešia sa väčšinou sklerotizáciou
- trombóza a embólia - riziko sa minimalizuje podávaním injekcií, nosením pančúch a najmä dostatkom pohybu
- modriny na stehne, vznikajú v miestach prítokov veľkej safény, najčastejšie na stehne, niekedy môžu byť väčšie, vtedy sa objavujú aj zatvrdliny v podkoží

Pokiaľ sa objavia u pacienta po operácii niektoré z vyššie uvedených komplikácií treba sa telefonicky spojiť s operátorom / mobilné číslo v hlavičke tohto poučenia/ alebo prísť na kontrolu v najbližšom možnom čase

Poučeniu som porozumel , čo potvrdzujem svojim podpisom.

.....

Súhlasím s vyššie uvedenou platbou za operáciu

.....